

Combitor 200 SL

Insecticide

Combitor 200 SL is a systemic soluble liquid concentrate insecticide for the protection of vegetables, fruit trees, date palms and ornamentals against various common pests.

كومبيتور 200 أس آل

مبيد حشرات مبيد للحشرات للاستخدام الزراعي



Combitor 200 SL is a 20% Soluble Liquid Concentrate containing 200g of Imidacloprid per liter, which, when diluted in water according to the DIRECTIONS FOR USE, will control insects on vegetables, fruit trees, citrus, palm trees and ornamentals.

Combitor 200 SL is a systemic insecticide with translaminar activity and has contact and stomach mode of action. Readily taken up by the plant and further distributed acropetally, with good root-systemic action. Imidacloprid acts as an antagonist by binding to postsynaptic nicotinic receptors in the insect central nervous system.

Combitor 200 SL works primarily through contact and stomach action, so good spray coverage is necessary. Mix with sufficient water and apply as a foliar spray to obtain uniform coverage. Treat plants when pests are immature or at a susceptible stage and populations are building, before crop damage occurs.

It demonstrates broad biological activity spectrum against:

Sucking insects: Aphids, Tuta absoluta, whiteflies, leaf and plant hoppers, thrips, scales, mealy bugs, bugs and psyllids.

Beetles: Leaf beetles, weevils, wireworms, grubs and other soil beetles.

Others: Leaf miners, dipteran species, termites and locusts.

1- طريقة و معدل الاستخدام

كومبيتور 200 أس آل مبيد حشرات من مجموعة النيتروجوتنديين يحتوي على 200 غرام مادة فعالة ايميداكلوبريد في اللتر بصيغة سائل مركز سريع المزج مع الماء لمكافحة العديد من الحشرات على الخضار والفواكه ونباتات الزينة.

إمزج كمية المبيد المركز مع الماء بحسب المعدل المطلوب ورشه بمرشات ظهرية أو ممكنة عالية الضغط للتغطية الشاملة خاصة تحت الأوراق و أعد العلاج بعد أسبوعين اذا

2- الإجراءات التي يتعين اتخاذها عقب رش المبيد:- وضع علامات تحذير في المنطقة المعاملة

3- المدة الزمنية التي يتعين انقضاءها بعد رش المبيد وقبل مباشرة استعمال الحقل / المزرعة / الموقع: يوم واحد



فترة الأمان	معدل الاستخدام	الإفة	المحاصيل
7 أيام	50 غرام مادة فعالة للهكتار	التوتا أبسولوتا، الذبابة البيضاء، المن، النطاطات، الترييس، صانعات الأنفاق الأوراق، ديدان الزهر و الثمار و الأوراق , حشرات قشرية.	الخضراوات
4 أيام	25 مللتر لكل 100 لتر ماء		القرعيات
21 يوم	50 مللتر لكل 100 لتر ماء	الذبابة البيضاء، النطاطات، الفراشات، ديدان الحمضيات، البق الدقيقي، صانعات الأنفاق	أشجار الفاكهة
21 يوم	20 مل / 5 لتر ماء للشجرة	حشرة الدوباس و الحميرة و حفارات الساق، سوسة التخيل الحمراء	أشجار النخيل
--	150-50 مللتر لكل 100 لتر ماء	نطاطات الأوراق - الديدان القارضة للجذور	المروج الخضراء نباتات الزينة

Systemic & Translaminar long-term activity

Composition:
Imidacloprid 200 g/L
Inert Ingredient Up to 100%

المبيد مقيد الاستخدام و لا يستعمل إلا تحت إشراف فني متخصص يستخدم كمبيد في الزراعة و لا يستخدم في الصحة عامة